

ID:

山口県立総合医療センター

様

パニツムマブ + mFOLFOX-6療法  
という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1コース 14 日 コース

休薬期間を含む(必須)

可能な限り繰り返し投与

|              | 投与量                     | 手技   | 時間   | Day1 | 2 | ..                    | .. | .. | .. | ..14 |
|--------------|-------------------------|------|------|------|---|-----------------------|----|----|----|------|
| ベクティビックス PAN | 6 mg/kg                 | 点滴静注 | 1hr  | ↓    |   |                       |    |    |    |      |
| エルプラット L-OHP | 85 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 | 2hr  | ↓    |   |                       |    |    |    |      |
| レボホリナート l-LV | 200 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2hr  | ↓    |   |                       |    |    |    |      |
| 5-FU         | 400 mg/m <sup>2</sup>   | 全開   |      | ↓    |   |                       |    |    |    |      |
| 5-FU         | 2,400 mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 | 46hr | ↓    | ↓ | (≡ インフュージョンポンプにて持続注入) |    |    |    |      |

Day 1

- 1) アロキシ静注 1 V  
デカドロン 6.6 mg 点滴静注 30分かけて  
生食 100 mL
- 2) ベクティビックス注 [ ] mg 6 mg/kg  
生食 100\*\* mL 点滴静注 60分かけて
- 3) 次の2種類の輸液を同時に投与  
エルプラット [ ] mg  
5%ブドウ糖注 250 mL 点滴静注 2時間かけて  
レボホリナート [ ] mg  
5%ブドウ糖注 250 mL 点滴静注 2時間かけて
- 4) 5-FU [ ] mg  
生食 50 mL 全開 (bolus) 投与

Day 1~2 (46時間)

- 5) 5-FU [ ] mg  
生食 mL 点滴静注 46時間かけて

\*\* 1回投与量として 1,000mgを超える場合は、生食を添加して全量を約 150mLとし、90分以上かけて点滴静注

※治療計画は変更になることがあります