

ID:

山口県立総合医療センター

様

ペムトレキセド+BEV療法(維持療法)
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 21日 コース
休薬期間を含む(必須) 継続投与

	投与量	手技	時間	Day-7	1	22	43	64	85
ペムトレキセド(アリムタ)	500 mg/m ²	点滴静注	10分	↓	↓	↓	↓	↓	↓
アバステン BEV	15 mg/kg	点滴静注	1.5hr	↓	↓	↓	↓	↓	↓
葉酸(パンビタン末1g)*1	0.5 mg/day	p.o.		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)*2	1 mg/day	i.m.		↓				↓	

*1 葉酸:ペムトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

*2 VB12:ペムトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

支持療法を含むセット

Day -7

- 1) メチコバル注500 μ 2 A(3コースごと) 筋注 (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与)
- 2) 調剤用パンビタン末 1g 1 \times 朝食後 21日分 内服 (最終投与日から22日目まで可能な限り投与)

Day 1

- 1) アロキシ 0.75 mg
デカドロン 6.6 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分
- 2) アリムタ mg 500mg/m² 点滴静注 10分
生食 100 mL
- 3) アバステン mg 15mg/kg 点滴静注 30分
生食 100 mL
- 4) 生食 50 mL フラッシュ

Day2から5日間

内服薬:
デカドロン(0.5mg) 9錠 3 \times 毎食後 5日分
セルベックス100mg 3cap 3 \times 毎食後 5日分

※治療計画は変更になることがあります