

ID:

山口県立総合医療センター

様

キイトルーダ+
PAC+CBDCA療法という治療です

外科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 21 日 4コース
休薬期間を含む(必須)

	投与量	手技	時間	Day121
キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	0.5hr	↓						
パクリタキセル PTX	200 mg/m ²	点滴静注	3hr	↓						
カルボプラチン CBDCA	6 AUC	点滴静注	1hr	↓						

支持療法を含むセット

休薬完了

通しNo.					day1	21
1)	アロキシ デカドロン 生食	0.75 mg 6.6 mg 100 ml		点滴静注	30分	↓
開始時、側管よりガスター1A+生食20mL 静注 レスタミンコーワ錠 50mg 内服						
2)	キイトルーダ 生食	200 mg 100 mL		点滴静注	30分	↓
3)	パクリタキセル 生食	mg 500 mL		点滴静注	3時間	↓
4)	カルボプラチン 生食	mg 350 mL		点滴静注	1時間	↓
5)	生食	50 mL		点滴静注	フラッシュ用	↓
内服薬						
	イメンドcap(125mg)	1cap	1日1回	治療1時間~1時間半前	day1に内服	
	イメンドcap(80mg)	1cap	1日1回	朝食後 2日間内服	day2から2日間内服	

※治療計画は変更になることがあります