

様

BEP 療法

という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1コース 21日 2~4 コース  
休薬期間を含む(必須) まで繰り返す

	投与量	手技	時間	Day1	2	3	4	5	..	・8・	..	・15・	..	・21
ランダ	CDDP 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1hr	↓	↓↓	↓↓	↓↓							
ラステット	VP-16 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1hr	↓	↓↓	↓↓	↓↓							
ブレオ	BLM 30 mg/boc	点滴静注	1hr	↓						↓		↓		
アロキシ		静注		↓										
プロイメンド		点滴静注	30分	↓										

支持療法を含むセット

Day 1

(メインルート)

1) ソリタT1	200 mL		点滴静注	30分
2) ブレオ	30 mg	30mg/body	点滴静注	30分
生食	100 ml		点滴静注	30分
3) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
4) 20%マンニトール	300 mL		点滴静注	1時間
5) プロイメンド	0.75 mg		側管	
デカドロン	6.6 mg			
生食	100 mL		点滴静注	30分
6) アロキシ	0.75 mg		側管	
生食	20 mL		静注	
7) ランダ	mg			
10%塩化ナトリウム	60 mL			
生食	200 mL		点滴静注	1時間
8) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
9) アセテート維持液3G	500 mL		点滴静注	1時間
10) ラステット	mg			
生食	500 mL		点滴静注	1時間
11) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
12) 5%ブドウ糖	500 mL		点滴静注	2時間

Day 2~5

1) ソリタT1	200 mL		点滴静注	30分
2) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
3) 20%マンニトール	300 mL		点滴静注	1時間
4) デカドロン	6.6 mg			
生食	100 mL		点滴静注	30分
5) ランダ	mg			
10%塩化ナトリウム	60 mL			
生食	200 mL		点滴静注	1時間
6) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
7) アセテート維持液3G	500 mL		点滴静注	1時間
8) ラステット	mg			
生食	500 mL		点滴静注	1時間
9) 生食	500 mL		点滴静注	1時間
10) 5%ブドウ糖	500 mL		点滴静注	2時間

Day 8,15

1) ソリタT1	200 mL		点滴静注	30分
2) ブレオ	mg			
生食	100 ml		点滴静注	30分
3) アセテート維持液3G	500 mL		点滴静注	1時間

※治療計画は変更になることがあります