

ID:

山口県立総合医療センター

様

RAM + FOLFIRI療法
という治療です

外科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 14 日 コース
休薬期間を含む(必須) 可能な限り繰り返し投与

		投与量	手技	時間	Day1	214
サイラムザ	RAM	8 mg/Kg	点滴静注	1.5hr	↓						
トポテシン	CPT-11	150 mg/m ²	点滴静注	1.5hr	↓						
レボホリナート	ℓ-LV	200 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
5-FU		400 mg/m ²	全開		↓						
5-FU		2,400 mg/m ²	持続静注	46hr	↓	↓	(≡ インフュージョンポンプにて持続注入)				

Day 1

- 1) アロキシ 0.75 mg
デカドロン 6.6 mg
生食 100 mL
点滴静注 30分かけて
- 2) サイラムザ [] mg
生食 250 mL
点滴静注 1時間かけて
- 3) 生食 50 mL
フラッシュ用 15分かけて
- 4) 次の2種類の輸液を同時に投与
トポテシン [] mg
生食 250 mL
点滴静注 1.5時間かけて
レボホリナート [] mg
5%ブドウ糖注 250 mL
点滴静注 2時間かけて
- 5) 5-FU [] mg
生食 50 mL
全開(bolus)投与

Day 1~2 (46時間)

- 6) 5-FU [] mg
生食 total 100 mL
点滴静注 46時間かけて

※治療計画は変更になることがあります