

ID:

山口県立総合医療センター

様

FOLFIRI療法という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1コース 14 日 コース
休薬期間を含む(必須) 可能な限り繰り返し投与

		投与量	手技	時間	Day1	214
トポテシン	CPT-11	150 mg/m ²	点滴静注	1.5hr	↓						
レボホリナート	ℓ-LV	200 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
5-FU		400 mg/m ²	全開		↓						
5-FU		2,400 mg/m ²	持続静注	46hr	↓	↓	(← インフュージョンポンプにて持続注入)				

Day 1

- 1) アロキシ 0.75 mg
デカドロン 6.6 mg
生食 100 ml
点滴静注 30分かけて
- 2) 次の2種類の輸液を同時に投与
トポテシン mg 150mg/m²
生食 250 mL 点滴静注 1.5時間かけて
レボホリナート mg 200mg/m²
5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 2時間かけて
- 3) 5-FU mg 400mg/m²
生食 50 mL 全開 (bolus) 投与

Day 1~2 (46時間)

- 4) 5-FU mg 2400mg/m²
生食 total 100 mL 点滴静注 46時間かけて(インフュージョンポンプ)

※治療計画は変更になることがあります