

ID:

山口県立総合医療センター

様

KRd療法という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1サイクル 28 日 コース

休薬期間を含む(必須)

1サイクル目	投与量	手技	時間	1週		2週		3週		4週	
				1	2	8	9	15	16	21	22
カイプロリス	20 mg/m ² (max 44mg)	点滴静注	10分	↓	↓						
カイプロリス	27 mg/m ² (max 59.4mg)	点滴静注	10分			↓	↓	↓	↓		
レナリドミド	25 mg/body	経口		連日投与							
デキサメタゾン DEX	40 mg/body	注		↓		↓		↓		↓	
デキサメタゾン DEX	4 mg/body	注		↓		↓		↓		↓	
※DEX内服(デキサメタゾン)8mg=DEX注(リン酸デキサメタゾン)6.6mg											
支持療法を含むセット				Day 1		Day 2		Day 8		Day 9	
				1	2	8	9	15	16	21	22
1) デカドロン注 生食	33 mg(5V) 50 ml	15分 点滴静注		↓		↓		↓		↓	
2) デカドロン注 生食	3.3 mg(1/2V) 50 ml	15分 点滴静注		↓		↓		↓			
3) 生食	50 ml	フラッシュ用		↓	↓	↓	↓	↓	↓		
4) カイプロリス 5%ブドウ糖	mg (day1,2) mg 50 mL	点滴静注 10分		↓	↓		↓	↓	↓		
5) 生食	500 mL	補液用 2時間点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓	↓		
6) ソリタT1	500 mL	補液用 2時間点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓	↓		

※治療計画は変更になることがあります

2~12サイクル目	投与量	手技	時間	1週		2週		3週		4週															
				1	2	..	8	9	..	15	16	..21	22...28												
カイプロリス	27 mg/m ² (max 59.4mg)	点滴静注	10分	↓	↓		↓	↓		↓	↓														
レナリドミド	25 mg/body	経口		連日投与																					
デキサメタゾン DEX	40 mg/body	注		↓			↓			↓	↓														
デキサメタゾン DEX	4 mg/body	注		↓			↓			↓	↓														
支持療法を含むセット				Day		1		2		..		8		9		..		15		16		..21		22...28	
1) デカドロン注 生食	33 mg(5V) 50 ml	15分 点滴静注		↓			↓			↓			↓			↓			↓			↓			
2) デカドロン注 生食	3.3 mg(1/2V) 50 ml	15分 点滴静注		↓			↓			↓			↓			↓			↓			↓			
3) 生食	50 ml	フラッシュ用		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		
4) カイプロリス 5%ブドウ糖	mg 50 mL	点滴静注 10分		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		
5) 生食	100 ml	補液用 30分点滴静注		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓		

※治療計画は変更になることがあります

13サイクル目以降				1週		2週		3週			4週																					
投与量	手技	時間	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28																	
カイクロリス	27 mg/m ² (max 59.4mg)	点滴静注	10分	↓	↓				↓	↓																						
レナリドミド	25 mg/body	経口		連日投与																												
デキサメタゾン DEX	40 mg/body	注		↓		↓			↓				↓																			
デキサメタゾン DEX	4 mg/body	注		↓					↓																							
支持療法を含むセット				Day		1		2		..		8		9		..		15		16		..		21		22		..		28		
1) デカドロン注 生食	33 mg(5V) 50 ml	15分 点滴静注		↓			↓						↓							↓												
2) デカドロン注 生食	3.3 mg(1/2V) 50 ml	15分 点滴静注		↓									↓																			
3) 生食	50 ml	フラッシュ用		↓	↓								↓	↓																		
4) カイクロリス 5%ブドウ糖	mg 50 mL	点滴静注 10分		↓	↓								↓	↓																		
5) 生食	100 ml	補液用 30分点滴静注		↓	↓								↓	↓																		

※治療計画は変更になることがあります