

ID:

山口県立総合医療センター

様

ペムトレキセド単独療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

1コース 21日 コース
休薬期間を含む(必須) 繰り返し投与

	投与量	手技	時間	Day-7	1	22	43	64	85
ペムトレキセド(アリムタ)	500 mg/m ²	点滴静注	10分		↓	↓	↓	↓	↓
葉酸(パンビタン末1g)*1	0.5 mg/day	p.o.		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)*2	1 mg/day	i.m.		↓				↓	

*1 葉酸:ペムトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

*2 VB12:ペムトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

支持療法を含むセット

抗がん剤投与前 7日

- | | | |
|--------------|---------------|----------------------------|
| 1) メチコバル | 2 A(3コースごと) | 筋注 (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与) |
| 2) 調剤用パンビタン末 | 1g 1×朝食後 21日分 | 内服 (最終投与日から22日目まで可能な限り投与) |

Day 1

- | | | | |
|----------------|------------------|------|------|
| 1) デカドロン
生食 | 6.6 mg
100 ml | 点滴静注 | 30分 |
| 2) アリムタ
生食 | mg
100 mL | 点滴静注 | 10分 |
| 3) 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 全開投与 |

※治療計画は変更になることがあります