

ID:

山口県立総合医療センター

様

ペメトレキセド+CBDCA療法  
という治療です

科

医師:  
看護師:  
薬剤師:

1コース 21日 コース  
休薬期間を含む(必須) 繰り返し投与

	投与量	手技	時間	Day-7	1	22	43	64	85
ペメトレキセド(アリムタ)	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分		↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン CBDCA	5 AUC	点滴静注	60分		↓	↓	↓	↓	↓
葉酸(パンビタン末1g)* <sup>1</sup>	0.5 mg/day	p.o.		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)* <sup>2</sup>	1 mg/day	i.m.		↓				↓	

\*1 葉酸:ペメトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与  
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

\*2 VB12:ペメトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与  
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

## 抗がん剤投与前 7日

- |              |               |    |                         |
|--------------|---------------|----|-------------------------|
| 1) メチコバル     | 2 A(3コースごと)   | 筋注 | (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与) |
| 2) 調剤用パンビタン末 | 1g 1×朝食後 21日分 | 内服 | (最終投与日から22日目まで可能な限り投与)  |

## Day 1

- |            |         |      |          |
|------------|---------|------|----------|
| 1) アロキシ    | 0.75 mg |      |          |
| デカドロン      | 6.6 mg  |      |          |
| 生食         | 100 ml  | 点滴静注 | 30分      |
| 2) アリムタ    | mg      | 点滴静注 | 10分      |
| 生食         | 100 mL  |      |          |
| 3) 生食      | 100 mL  | 点滴静注 | 30分      |
| 4) カルボプラチン | mg      |      |          |
| 生食         | 350 mL  | 点滴静注 | 60分(1時間) |
| 5) 生食      | 50 mL   | 点滴静注 | 全開投与     |

## 内服薬

イメンドcap(125mg)	1cap	1日1回	治療1時間~1時間半前	day1に内服
イメンドcap(80mg)	1cap	1日1回	朝食後 2日間内服	day2から2日間内服

※治療計画は変更になることがあります