

ID:

山口県立総合医療センター

様

GC 療法 という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 28 日 6 コース
休薬期間を含む(必須)

Table with columns: 投与量, 手技, 時間, Day1, 2, 8, 15, 28, 29. Rows include Gemzar (GEM) and Lomustine (CDDP).

支持療法を含むセット

Day 1, 8, 15

- 1) デカドロン 生食 6.6 mg 100 ml 点滴静注 30分かけて
2) ジェムザール 5%ブドウ糖注 mg 100 mL 点滴静注 30分かけて
3) 生食 50 mL フラッシュ用

Day 2

- 1) アロキシ デカドロン 生食 0.75 mg 6.6 mg 100 ml 点滴静注 30分
2) 生食 生食 500 mL 500 mL 点滴静注 1時間 点滴静注 1時間
3) 20% マンニトール 300 mL 点滴静注 1時間
4) 5%ブドウ糖注 500 mL 点滴静注 1時間
5) ランダ 10%塩化ナトリウム注 生食 mg 60 mL (20mL x 3本) 200 mL 点滴静注 1時間
6) 生食 生食 500 mL 500 mL 点滴静注 1時間 点滴静注 1時間
7) アセテート維持液3G 500 mL 点滴静注 1時間
8) ヴィーンD 500 mL 点滴静注 1時間

イメンドcap (125mg) 1cap 1日1回 治療1時間~1時間半前 ランダ 治療日に内服
イメンドcap (80mg) 1cap 1日1回 朝食後 2日間内服 ランダ治療翌日から2日間内服

※治療計画は変更になることがあります