

ID:

山口県立総合医療センター

様

FOLFIRINOX療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 14 日 コース
休薬期間を含む(必須) 可能な限り繰り返し投与

	投与量	手技	時間	Day1	214
エルプラット	L-OHP 85 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
トポテシン	CPT-11 180 mg/m ²	点滴静注	1.5hr	↓						
レボホリナート	ℓ-LV 200 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
5-FU	400 mg/m ²	全開		↓						
5-FU	2,400 mg/m ²	持続静注	46hr	↓	↓	(≒ 持続注入)				

Day 1

- 1) アロキシ 0.75 mg
デカドロン 9.9 mg
生食 100 ml
点滴静注 30分かけて
- 2) エルプラット [] mg
5%ブドウ糖注 250 mL
点滴静注 2時間かけて
次の2種類の輸液を同時に投与
- 3) トポテシン [] mg
生食 250 mL
点滴静注 1.5時間かけて
- 3) レボホリナート [] mg
5%ブドウ糖注 250 mL
点滴静注 2時間かけて
- 4) 5-FU [] mg
生食 50 mL
全開(bolus)投与

Day 1~2 (46時間)

- 5) 5-FU [] mg
生食 1000 mL(total量)
点滴静注 46時間かけて

内服薬

イメンドcap(125mg)	1cap	1日1回	治療1時間~1時間半前	治療日に内服
イメンドcap(80mg)	1cap	1日1回	朝食後 2日間内服	治療翌日から2日間内服
デカドロン錠(4mg)	2錠	1日2回	朝、昼食後 3日間内服	治療翌日から3日間内服
ワイパックス錠(0.5mg)	2錠	1日2回	朝、眠前 5日間内服	当日夜から内服

吐き気強い場合

day4から 2日分 イメンド(80)を追加

day5に デカドロン錠(4mg) 2錠 1日2回朝、昼食後 追加