山口県立総合医療センター

ID:

様

DLd療法療法という治療です

医師:

看護師: 薬剤師:

【治療計画】 1サイクル 28日 休薬期間を含む(必須) コース 以下参照

			サイクル数 1~2サイクル(1~8週)							
	投与量		手技		Day	1 2	8 9	15 16	22 23	28
ダラザレックス	16 r	ng/kg	点滴静注			\downarrow	1	\downarrow	1	
レナリドミド	25 r	mg/body	経口			day1~	· 21			
デキサメタゾン DEX (デカドロン注)	20 r	mg/body	点滴静注			Ţ	Ţ	ļ	\downarrow	
デキサメタゾン DEX	20 r	mg/body	経口	(1回 5錠)		\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	
(レナデックス4mg) 前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤	FI]		経口			ļ	\downarrow	\downarrow	\downarrow	
※DEX内服(デキ	・サメタゾン	√)8mg=DI	EX注(リン酸デキ	ナナメタゾン)(·			
支持療法を含むセット					Day	1 2	8 9	15 16	22 23	28
通しNo. 1) デカドロン注 生食	2.5 V 100 n		30分 点滴静注			1	1	\downarrow	\downarrow	
2) 生食	100 r	nl	30分 点滴静注			1	1	ļ	\downarrow	
3) ダラザレックス(1コース目) 生食	1000 n	ng nL	点滴静注 【0~1時間⇒5 【1~2時間⇒1 【2~3時間⇒1 【3時間以降⇒	00mL/h] 50mL/h]		1	\downarrow	1	1	
3) ダラザレックス(2コース目以降) 生食	1000 n 500 n		点滴静注 【0~1時間⇒1 【1~2時間⇒1 【2時間以降⇒	50mL/h]	大200mL/h)		↓ス目以	↓ 降は500	↓)mLで希	;釈)
4) ソリタ-T1号	500 n	nL	点滴静注 2時間かけて			Ţ	1	Ţ	Ţ	
前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤 カロナール (500) ポララミン(2)	刊 2 鉅 2 釒		1~3時間前ま 内服	でに						

			サイクル数	3~	6サイクル(9~	~24週)	
	投与量	手技	Day	1 2	8 9 15 10	6 22 23	28
ダラザレックス レナリドミド デキサメタゾン DEX (デカドロン注)	16 mg/kg 25 mg/body 20 mg/body	点滴静注 経口 点滴静注		↓ <mark>day1</mark> ↓	→21 ↓		
デキサメタゾン DEX (レナデックス4mg)	20 mg/body		(1回 5錠)	.	↓ ↓ ↓ day8~14 のいずれか	↓ day22~2 のいずれか	28
前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤		経口		Ţ	Ţ		
	サメタゾン)8mg=DE	EX注(リン酸デキ					
支持療法を含むセット			Day	1 2	8 9 15 10	6 22 23	28
通しNo. 1) デカドロン注 生食	2.5 V 100 ml	30分 点滴静注		ļ	Ţ		
2) 生食	100 ml	30分 点滴静注		\downarrow	1		
3) ダラザレックス(2コース目以降) 生食	mg 500 mL	点滴静注 【0~1時間⇒10 【1~2時間⇒13 【2時間以降⇒2		↓]	1		
4) 生食	50 mL	フラッシュ用		\downarrow	1		
前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤 カロナール (500) ポララミン(2)	 2 錠 2 錠	1~3時間前ま [~] 内服	でに 				

接与量 手技 Day 7サイクル(25週)以降	•
ダラザレックス 16 mg/kg 点滴静注 ↓ day1~21	<u> 2 </u>
レナリドミド 25 mg/body 経口	
デキサメタゾン DEX 20 mg/body 点滴静注 (デカドロン注) デキサメタゾン DEX 20 mg/body 経口 (1回 5錠) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
(デカドロン注) デキサメタゾン DEX 20 mg/body 経口 (1回 5錠) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
デキサメタゾン DEX 20 mg/body 経口 (1回 5錠) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
(レナデックス4mg) 前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤 ※DEX内服(デキサメタゾン)8mg=DEX注(リン酸デキサメタゾン)6.6mg 支持療法を含むセット Day 1 2 8 9 15 16 2 通しNo. 1) デカドロン注 2.5 V 30分	_
前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤 経口 ↓ **********************************	<mark>↓↓</mark>
前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤 経口 ↓ ※DEX内服(デキサメタゾン)8mg=DEX注(リン酸デキサメタゾン)6.6mg 支持療法を含むセット Day 1 2 8 9 15 16 2 通UNo. 1) デカドロン注 2.5 V 30分 ↓ ↓	
支持療法を含むセット	19 1120
支持療法を含むセット	
通しNo . 1) デカドロン注 2.5 V 30分 ↓	
1) デカドロン注 2.5 V 30分 ↓	2 23 28
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
L A 100 1 上次 th 2	
生食 100 ml 点滴静注	
2) 生食 100 ml 30分 ↓	
点滴静注	
3) ダラザレックス (2コース目以降) mg 点滴静注 ↓	
生食 500 mL 【0~1時間⇒100mL/h】	
【1~2時間⇒150mL/h】	
【2時間以降⇒200mL/h(最大200mL/h)】	
4) 生食 50 mL フラッシュ用 ↓	
┃ ┃前投薬:解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤	
加え来: 解放誤補用・加に入りミン用	
プロケール (300) 2 錠 1~3時間削までに ポララミン(2) 2 錠 内服	
M ノノベン (4) 4 YIJIK	