

様

ペトレキセド+CBDCA+BEV療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 21日 4~6 コース
休薬期間を含む(必須)

	投与量	手技	時間	Day-7	1	22	43	64	85
ペトレキセド(アリムタ)	500 mg/m ²	点滴静注	10分		↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分		↓	↓	↓	↓	↓
アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	1.5hr		↓	↓	↓	↓	↓
葉酸(パンビタン末1g)*1	0.5 mg/day	p.o.		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)*2	1 mg/day	i.m.		↓				↓	

*1 葉酸:ペトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

*2 VB12:ペトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

支持療法を含むセット

Day -7

- | | | |
|--------------|---------------|----------------------------|
| 1) メチコバル | 2 A(3コースごと) | 筋注 (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与) |
| 2) 調剤用パンビタン末 | 1g 1×朝食後 21日分 | 内服 (最終投与日から22日目まで可能な限り投与) |

Day 1

- | | | |
|------------|---------|---------------------------------|
| 1) アロキシ | 0.75 mg | |
| デカドロン | 6.6 mg | |
| 生食 | 100 ml | 点滴静注 30分 |
| 2) アリムタ | mg | 点滴静注 10分 |
| 生食 | 100 mL | |
| 3) 生食 | 100 mL | 点滴静注 30分 |
| 4) カルボプラチン | mg | |
| 5%ブドウ糖液 | 250 mL | 点滴静注 60分(1時間) |
| 5) アバスチン | mg | |
| 生食 | 100 mL | 点滴静注
初回1.5hr、2回目1hr、3回目以降30分 |
| 6) 生食 | 50 mL | フラッシュ |

内服薬

- | | | | | |
|----------------|------|------|-------------|-------------|
| イメンドcap(125mg) | 1cap | 1日1回 | 治療1時間~1時間半前 | day1に内服 |
| イメンドcap(80mg) | 1cap | 1日1回 | 朝食後 2日間内服 | day2から2日間内服 |

※治療計画は変更になることがあります