

ID:

山口県立総合医療センター

様

キイトルーダ+  
ペムトレキセド療法

外科

医師:  
看護師:  
薬剤師:

1コース 21日 コース  
休薬期間を含む(必須)

	投与量	手技	時間	Day-7	1	..	..	..	..	21
キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	0.5hr		↓					
ペムトレキセド(アリムタ)	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分		↓					
葉酸(パンビタン末1g)*1	0.5 mg/day	p.o.			⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)*2	1 mg/day	i.m.			↓					

\*1 葉酸:ペムトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与  
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

\*2 VB12:ペムトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与  
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

### 支持療法を含むセット

#### 抗がん剤投与前 7日

- 1) メチコバル 2 A(3コースごと) 筋注 (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与)
- 2) 調剤用パンビタン末 1g 1×朝食後 21日分 内服 (最終投与日から22日目まで可能な限り投与)

通しNo.					day1	休薬完了 21
1)	デカドロン 生食	6.6 mg 50 mL		点滴静注	15分	↓
2)	キイトルーダ 生食	200 mg 100 mL		点滴静注	30分	↓
3)	アリムタ 生食	mg 100 mL		点滴静注	10分	↓
4)	生食	50 mL		点滴静注	フラッシュ用	↓

#### Day 2～ 5日間

内服薬:

- デカドロン(0.5mg) 9錠 3×毎食後 5日分
- テプレノンカプセル 3cap 3×毎食後 5日分

内服薬:

- デカドロン(0.5mg) 9錠 3×毎食後 5日分
- テプレノンカプセル 3cap 3×毎食後 5日分

※治療計画は変更になることがあります