

ID:

山口県立総合医療センター

様

G-CHOP療法
という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1サイクル 21日 6コース

休業期間を含む(必須)

3週毎に投与

	投与量	手技	サイクル数 Day	1サイクル						2~6サイクル																			
				1	2	3	4	5	6	8	15	21	1	2	3	4	5	6	..	21									
ガザイバ	1,000 mg/body	点滴静注		↓						↓	↓	↓								休薬									休薬
アドリアシン	ADR 50 mg/m ²	点滴静注	0.5hr	↓																完了			↓						完了
オンコビン	VCR 1.4 mg/m ² (Max: 2mg/body)	静注		↓																			↓						
エンドキサン	CPM 750 mg/m ²	点滴静注	3 hr	↓																			↓						
プレドニゾロン	PSL 50 mg/m ²	内服		↓	↓	↓	↓	↓	↓														↓	↓	↓	↓	↓	↓	

支持療法を含むセット	通しNo.	投与量	手技	サイクル数 Day	1サイクル						2~6サイクル																	
					1	2	3	4	5	6	8	15	21	1	2	3	4	5	6	..	21							
1) デカドロン注 生食		16.5 mg (2.5V) 100 mL	1時間 点滴静注		↓					↓	↓	↓							休薬 完了			↓						休薬 完了
2) カロナール(200) ポララミン(2)		2錠 2錠	ガザイバ投与開始 30分前までに内服		↓																	↓						
3) ガザイバ 生食		mg total量 250 mL	3時間15分 ~4時間15分 点滴静注		↓																	↓						
4) 生食		100 ml	30分(経過観察)		↓																	↓						
5) アロキシ 生食		0.75 mg 50 mL	点滴静注		↓																	↓						
6) オンコビン 生食		2 mg 20 mL	ワンショット静注		↓																	↓						
7) アドリアシン 生食		70 mg 100 mL	30分 点滴静注		↓																	↓						
8) エンドキサン 生食		1100 mg 500 mL	3時間 点滴静注		↓																	↓						
9) 生食		50 mL	フラッシュ用		↓																	↓						
Day 2~6 (5日間) プレドニゾロン錠		mg	内服		day2から5日間内服 【朝錠、昼錠、夕錠】																							

※DEX内服(デキサメタゾン)8mg=DEX注(リン酸デキサメタゾン)6.6mg